


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดหนองคาย สัปดาห์ที่ 43 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดจากสำนักระบาดวิทยา ณ 27 ตุลาคม 2558)

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 ตุลาคม 2558 ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ทั้งหมด 98,404 ราย (อัตราป่วย 151.1 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 98 ราย (อัตราตาย 0.15 ต่อประชากรแสนคน) อัตราป่วยตายร้อยละ 0.1 จังหวัดหนองคาย อัตราป่วยสูงเป็น อันดับ 3 ของเขตเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 อันดับ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอันดับ 56 ของประเทศไทย



สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย (1 มกราคม – 30 ตุลาคม 2558)

- เป้าหมายโรคไข้เลือดออกของจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2558 ไม่เกิน 192 ราย อัตราป่วย 37.74 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต



ค่าพยากรณ์โรค พ.ศ. 2558 เป็น
63.13 ต่อประชากรแสนคน หรือ 327 ราย

- มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 435 ราย อัตราป่วย 84.1 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.69 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยนอก 11% ผู้ป่วยใน 89% แยกเป็น DF 28.7% , DHF 70.6% , DSS 0.7 %

- จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน พ.ศ. 2558 สูงกว่า พ.ศ. 2557 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง โดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่ 33-42 (กลางเดือนสิงหาคมถึงปัจจุบัน) มีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และ พ.ศ. 2557 มากในทุกสัปดาห์มาตลอด โดยสูงเป็น 5.74 และ 8.62 เท่า ตามลำดับ
- อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเป็น 1.01 : 1 อยู่ในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (306.2 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 5-9 ปี (228.9 ต่อแสน) และกลุ่มอายุ 15-24 ปี (187.2 ต่อแสน)
- พบอัตราป่วยสูงกว่าเป้าหมายปี 2558 ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอโพนพิสัย และอำเภอสังคม โดยอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับที่ อำเภอเมืองหนองคาย 181.84 สระใคร 75.67 ท่าบ่อ 68.72 ฝ้าไร่ 65.45 ศรีเชียงใหม่ 58.66 รัตนวาปี 25.91 โพนพิสัย 20.39 สังคม 16.14 และโพธิ์ตาก 13.07
- อำเภอที่มีค่าบ่งชี้พบผู้ป่วยต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ได้แก่ อำเภอเมือง ตำบลในเมือง (สัปดาห์ที่ 32-42) และ ตำบลค่ายบกหวาน (สัปดาห์ที่ 37-42) ตำบลหนองกอมเกาะ (สัปดาห์ที่ 39-42)

สรุปภาพรวมโรคไข้เลือดออกจังหวัดหนองคาย มีอัตราป่วยและอัตราป่วยตายเกินเป้าหมายที่กำหนดในปี 2558 และยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องสูงสุดในเดือนกันยายน-ตุลาคม แม้จะเป็นช่วงที่ผู้ป่วยน่าจะลดลงตามลักษณะการระบาดซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมา ที่พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ดังนั้นทุกพื้นที่ต้องมีการกำกับติดตามการควบคุมดัชนีลูกน้ำยุงลายให้ได้ตามเกณฑ์อย่างจริงจัง เพื่อลดการระบาดที่จะต่อเนื่องถึงปลายปีต่อต้นปี 2559 ที่มีแนวโน้มว่าผู้ป่วยจะมากกว่าปี 2558 นี้