


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดหนองคาย

1 มกราคม - 29 สิงหาคม 2559


สถานการณ์โรคของประเทศไทย (ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ณ 29 สิงหาคม 2559)

ตั้งแต่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2559 ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งหมด 33,352 ราย (อัตราป่วย 50.98 ต่อประชากรแสนคน) เสียชีวิต 27 ราย (อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.08) จังหวัดหนองคายมีอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 56 ของเขตสุขภาพที่ 8 อันดับ 19 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ อันดับ 70 ของประเทศไทย




สถานการณ์โรคของจังหวัดหนองคาย

- เป้าหมายโรคไข้เลือดออกของจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ไม่เกิน 188 ราย อัตราป่วย 36.35 ต่อประชากรแสนคน และไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- ค่าคาดการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2559 ผู้ป่วย 766 ราย อัตรา 148.09 /แสน



- 1 มกราคม – 29 สิงหาคม 2559 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 143 ราย อัตราป่วย 27.65 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยนอก 38.46% ผู้ป่วยใน 61.54% แยกเป็น DF 52.45% , DHF 44.75% , DSS 2.80% มีผู้ป่วยเดือนมกราคม 17 ราย กุมภาพันธ์ 19 ราย มีนาคม 19 ราย เมษายน 7 ราย พฤษภาคม 8 ราย มิถุนายน 13 ราย และ กรกฎาคม 29 ราย และสิงหาคม 31 ราย

- ภาพรวมจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ในช่วงเดียวกันของค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และ พ.ศ. 2558 สูงกว่า พ.ศ. 2559 เป็น 1.31 เท่า และ 1.90 เท่า ตามลำดับ โดย พ.ศ. 2558 สูงกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 14 เป็นต้นมา ส่วนค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังสูงกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ 21 แต่สัปดาห์ที่ 33 ผู้ป่วย พ.ศ. 2559 สูงกว่ามัธยฐาน
- อัตราส่วนเพศหญิงต่อชายเป็น 1.01 : 1 ส่วนใหญ่อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (114.81 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 5-9 ปี (104.89 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 15-24 ปี (44.58 ต่อแสน) กลุ่มอายุ 0-4 ปี (43.85 ต่อแสน)
- รายงานพบผู้ป่วยใน 8 อำเภอ (88.9% ของอำเภอทั้งหมด) โดยอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงเรียงลำดับที่อำเภอเฝ้าไร่ 46.20 (24 ราย) สระใคร 41.63 (11 ราย) สังคม 40.36 (10 ราย) ท่าบ่อ 39.78 (33 ราย) โพนพิสัย 27.53 (27 ราย) เมืองหนองคาย 22.9 (34 ราย) รัตนวาปี 7.77 (3 ราย) ศรีเชียงใหม่ 3.26 (1 ราย) ส่วนอำเภอโพธิ์ตากยังไม่มีรายงานผู้ป่วย
- ช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด พบจำนวนผู้ป่วยที่อำเภอเมืองหนองคาย 14 ราย ท่าบ่อ 6 ราย โพนพิสัย 3 ราย สระใคร 2 ราย เฝ้าไร่ 1 ราย



ทุกอำเภอสามารถควบคุมโรคได้ไม่เกิน 2 เท่า
ของระยะฟักตัวที่ยาวที่สุด
นับจากวันพบผู้ป่วย (28 วัน)